



Dr. MOTTAGHI
SKIN & HAIR CLINIC

فرم مراقبت‌های تزریق ژل و فیلر (A-1-50)

- ۱- از ماساژ دادن محل تزریق به جز در مواردی که پزشک اعلام می‌کند، خودداری نمایید.
- ۲- از مصرف نوشیدنی‌های خیلی داغ و خیلی سرد، غذاهای خیلی تند و ادویه دار، غذای خیلی سفت، تزریق کورتون، سیگار، مشروبات الکلی، قلیان، و بوسیدن تا یک هفته اجتناب کنید.
- ۳- کبودی و تورم بعد از تزریق ژل تا ده روز کاملاً طبیعی است، با گذاشتن کمپرس آب سرد در ۲۴ ساعت اول این تورم کمتر خواهد شد. در صورت طولانی شدن این موضوع، با کلینیک تماس بگیرید.
- ۴- تعدادی قرص آنتی‌بیوتیک و در صورت صلاح‌دید پزشک، یک کرم ترمیم کننده برای شما تجویز می‌گردد، حتماً آن‌ها را به موقع مصرف کنید. در صورتی که سابقه تبخال زدن یا حساسیت دارید، پزشک را مطلع کنید.
- ۵- از آرایش محل تزریق تا سه روز خودداری کنید. اگر محل تزریق خشک شده است، از ترمیم کننده استفاده کنید. از شستشوی محل تزریق تا ۲۴ ساعت پرهیز کنید.
- ۶- اگر بعد از دو هفته، عدم تقارن در محل تزریق مشاهده کردید و یا تمایل به افزایش یا کاهش حجم ژل داشتید، حتماً برای مشاوره با کلینیک تماس بگیرید.
- ۷- توجه داشته باشید که بلافاصله بعد از تزریق فیلر، به علت وجود مواد بی‌حسی و تورم ناشی از ورود نیدل سرنگ به پوست شما، محل تزریق کاملاً متورم است و شکل نهایی محل تزریق مدتی بعد مشخص می‌گردد، در چنین شرایطی کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی حجم ژل کاملاً طبیعی و اجتناب ناپذیر است.
- ۸- در مواردی که افراد دارای لب‌های کوچک هستند، یا برای اولین بار اقدام به تزریق ژل می‌کنند، یا برای پر کردن خط خنده، یا برجسته کردن گونه، یا زاویه‌سازی صورت مراجعه کرده اند، توصیه می‌شود از حجم بیشتری ژل جهت تزریق استفاده کنند.
- ۹- افرادی که برای اولین بار تزریق ژل انجام می‌دهند، کاهش حجم بیشتری را نسبت به دیگران شاهد خواهند بود. بدیهی است در صورت شارژ، ماندگاری ژل بیشتر می‌گردد.
- ۱۰- در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره ۰۹۱۹۳۷۶۷۳۵۰ در تماس باشید.

Dr.mottaghiclinic (اینستاگرام)
Dr.mottaghiclinic.com (نوبت‌دهی)

Dr. Mottaghi
SKIN & HAIR CLINIC

0917 599 2989 (رزرو نوبت ترمیم رایگان)
0919 376 7350 (رزرو نوبت مشاوره رایگان)
0919 460 8020 (واحد حسابداری و مشاوره اقساط)