

فرم مراقبت‌های بعد از لیزر اندولیفت (F ۱-D)

- ۱- تا یک هفته بعد از انجام اندولیفت امکان ورم وجود دارد که طبیعی است.
- ۲- التهاب بعد از لیزر اندولیفت طبیعی است و تا ۲۴ ساعت اول بهتر است از کمپرس یخ استفاده نشود.
- ۳- در صورت احساس درد از مسکن استفاده شود. (استامینوفن ساده)
- ۴- آنتی بیوتیک ها و کرم تجویز شده به موقع مصرف شود.
- ۵- در صورت داشتن سابقه تبخال، قرص تبخال مصرف شود.
- ۶- در صورت مشاهده ورم غیر طبیعی و قرمزی بسیار شدید حتما با هماهنگی قبلی به پزشک مراجعه کنید.
- ۷- به مدت ۲ تا ۳ روز بعد از درمان طبق نظر پزشک متخصص خود می توانید از مصرف داروهای رقیق کننده خون خودداری نمایید(قطع دارو فقط زیر نظر پزشک متخصص صورت پذیرد).
- ۸- از مصرف الکل و دخانیات به مدت ۳ روز پس از درمان اجتناب نمایید.
- ۹- از آرایش کردن به مدت ۲۴ ساعت اجتناب نمایید.
- ۱۰- در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره ۰۹۱۹۳۷۶۷۳۴۰ در تماس باشید.

Drmottaghiclinic (ایнстاستاگرام)
Drmottaghiclinic.com (نوبت‌دهی)